



Tratamiento

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, solo se requiere:

01

**CONTROL DE
SÍNTOMAS**

02

**SOPORTE
VITAL**

03

**SUPLEMENTOS
DE
VITAMINA A**



La **OMS recomienda** que todos los niños diagnosticados con sarampión deben recibir **dos dosis de suplementos de vitamina A**, con un intervalo de veinticuatro horas entre ambas.



Lo anterior con el objetivo de **restaurar los niveles de dicha vitamina**, pues durante la enfermedad suelen ser bajos; asimismo, se pretende **ayudar a prevenir las lesiones oculares** y la ceguera.



Además, se ha demostrado que los **suplementos de vitamina A reducen la mortalidad por sarampión en un 50%**. Por lo anterior, la OMS recomienda las siguientes dosis:

Dosis recomendada

Edad	Dosis
Niños y niñas mayores de 12 meses.	200 000 UI/día durante dos días.
En niños y niñas de seis a 11 meses.	100 000 UI/día durante dos días.
En niños y niñas menores de seis meses.	50 000 UI/día durante dos días.

Referencias

- Organización Panamericana de la Salud. Sarampión. [Internet]. Washington D. C., Estados Unidos: OPS; 2022. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/sarampion>
- Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica Sarampión en la Región de las Américas. [Internet]. Washington D. C., Estados Unidos: OPS/OMS; 2025. Disponible en: <https://www.paho.org/sites/default/files/2025-05/2025-may-2-phe-actualizacion-epi-sarampion-es-final.pdf>
- Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Aviso epidemiológico. [Internet]. México: CONAVE; 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/990598/Aviso_Epidemiologico_Sarampio_n_16_abril_2025.pdf
- Secretaría de Salud. Programa de vacunación universal. Lineamiento generales 2025. [Internet]. Consultado en mayo 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977163/Lineamientos_Generales_2025_.pdf