

MPOX

Definiciones operacionales

Caso probable

Persona de cualquier edad y sexo, que presente una o múltiples lesiones cutáneas (mácula, pápula, vesícula, pústula y/o costra) o de mucosas y con la presencia de uno o más de los siguientes signos o síntomas:

- Fiebre
- Mialgias
- Cefalea
- Linfadenopatías
- Astenia
- Artralgias
- Lumbalgia
- Dolor perianal
- Tenesmo

Y cumpla con una de las siguientes condiciones:

- No cuente con un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual
- Sea un contacto de un caso confirmado

En personas con inmunocompromiso, la presencia de una o múltiples lesiones cutáneas (mácula, pápula, vesícula, pústula y/o costra) o de mucosas sin presencia de otros signos o síntomas se considerará un caso probable.



Caso confirmado por laboratorio

Caso probable con un resultado de muestra positivo a virus de mpox procesado por el InDRE o por los laboratorios regionales avalados por el InDRE para el diagnóstico de mpox.

Caso descartado por laboratorio

Caso probable con un resultado negativo a virus de mpox procesado por el InDRE, o por los Laboratorios Regionales por los Laboratorios Regionales avalados por el InDRE para el diagnóstico de mpox.

MPOX

Definiciones operacionales

Caso confirmado por Asociación Clínica Epidemiológica


Caso probable que no cuente con muestra y en el cual se documente la asociación epidemiológica en los 21 días previos al inicio de los síntomas con un caso confirmado por laboratorio.

Caso probable con resultado de laboratorio no concluyente o no adecuado y que no sea posible la obtención de la segunda muestra como lo establece el algoritmo diagnóstico y en el cual se documente la asociación epidemiológica con un caso confirmado por laboratorio.

Definición de contacto

Persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso probable o confirmado en los últimos 21 días:

- Contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto sexual.
- Inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas.
- Contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas (p. ej., costras).
- Contacto con fómites o materiales contaminados, como ropa, ropa de cama y utensilios de uso personal sin el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.



Definición de reinfección

Persona que actualmente cumple con los criterios para un caso confirmado de mpox, y además:

- Tenga antecedentes documentados de un episodio previo de mpox, como caso confirmado.
- Se confirme una resolución clínica completa (desaparición de todos los síntomas clínicos de mpox, incluyendo fiebre, escalofríos, linfadenopatía, erupciones cutáneas, lesiones u otras alteraciones de la piel causadas por MPXV y cualquier otro síntoma persistente asociado con la infección por MPXV)
- El tiempo transcurrido entre la resolución del primer episodio y la aparición de nuevos síntomas es de tres meses o más.