




Esquema de vacunación contra el sarampión

Con el objetivo de reducir la población susceptible y la transmisión sostenida del sarampión, es necesario **intensificar las estrategias de vacunación**. Para ello, el personal de Enfermería cumple un rol esencial ante la administración de la **vacuna triple viral (SRP) y doble viral (SR)**.

La vacuna es una preparación de cepas de virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y parotiditis producidas en cultivos de células diploides humanas o en embrión de pollo que deberán administrarse de acuerdo con el grupo de edad como se muestra a continuación.



Triple viral (SRP)

Doble viral (SR)

¿A QUIÉN SE ADMINISTRA?

Niños de 12 meses a 9 años.

Personas de 10 años a 49 años.

¿CUÁL ES LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN?

Vía subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo.

Vía subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo.

¿EN QUÉ DOSIS SE ADMINISTRA?

Administrar dos dosis de 0.5 ml de la siguiente manera:

1.ª dosis: 12 meses de edad.

2.ª dosis: 18 meses de edad (niños y niñas nacidos a partir de julio 2020), así como niñas y niños de 6 años (nacidos antes de julio 2020).

Personas que no cuenten con esquema completo de SRP en la infancia o que no exista evidencia documental: aplicar dos dosis de vacuna SR, 0.5 ml, con un intervalo de cuatro semanas entre dosis.

Personas con una dosis previa de vacuna SR o SRP, administrar una dosis de la vacuna SR.

Preferir la vacuna triple viral (SRP) para iniciar o completar el esquema en población de 1 a 9 años.

Vacunación en localidades/municipios con riesgo muy alto, con casos probables y confirmados

Niños y niñas de 6 a 11 meses:


- Administrar “**dosis cero**” (no cuenta como parte del esquema); preferir la vacuna **SR**. Si no existe inventario, aplicar SRP.
- Posteriormente, a los 12 meses aplicar **1.ª dosis de SRP** (intervalo mínimo de un mes).
- Finalmente, completar el esquema a los 18 meses con una **2.ª dosis de SRP**.

Niños y niñas de 1 a 9 años:

administrar una dosis (0.5ml) de SRP para iniciar o completar esquema..

Población de 10 a 49 años:

administrar una dosis de SR para iniciar o completar su esquema vacunal.



Referencias

- Secretaría de Salud. Manual de Vacunación 2021. [Internet]. México: SSA; 2021 [Consultado en mayo de 2025] Disponible en: https://drive.google.com/file/d/19am3cMC-88a28QxUjb1OO34vO_jLkFh3/view
- Secretaría de Salud. Plan de respuesta rápida para la interrupción del brote de sarampión. México, 2025. [Consultado en julio de 2025]
- Secretaría de Salud. Programa de Vacunación Universal. Lineamientos técnicos para la campaña de recuperación de coberturas 2024. [Internet]. México: SSA; 2024. [Consultado en mayo de 2025]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/905605/Lineamientos_de_Campan_a_de_Vacunacion_y_Recuperacion_de_Coberturas_2024_Vf.pdf
- Secretaría de Salud. Programa de vacunación universal. Lineamientos generales 2025. [Internet]. México: SSA; 2025 [Consultado en mayo de 2025]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977163/Lineamientos_Generales_2025_.pdf
- Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. Aviso Epidemiológico. Situación epidemiológica de sarampión en México 2025. 2025 [Internet]. México: SINAVE, CONAVE; 2025 [Consultado en mayo de 2025] Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/990598/Aviso_Epidemiologico_Sarampio_n_16_abril_2025.pdf
- World Health Organization. Weekly epidemiological record. [Internet] 2017 [Citado mayo 2025]; No. 17, 2017, 92, 205-228. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/255149/WER9217.pdf?sequence=1>