


Norovirus Etiología

El norovirus es un agente **altamente contagioso** perteneciente a la familia *Caliciviridae* y causa común de **enfermedad gastrointestinal aguda** en todo el mundo.¹

Se propaga fácil y rápidamente²



Genotipos¹

I

II

III

IV

V

VI

VII


De los siete grupos conocidos de norovirus, los genogrupos I y II son los responsables de la gran mayoría de los casos humanos y de los cuadros clínicamente importantes.

La principal cepa involucrada es la **GII.4**.¹

Los brotes transmitidos por el agua tienden a asociarse con cepas del genogrupo I.

Los brotes invernales se relacionan frecuentemente con cepas del genogrupo II.

La enfermedad producida por la cepa GII.4 tiende a ser más grave y asociarse con mayor mortalidad.¹



Los alimentos de alto riesgo de contaminación incluyen los que se sirven crudos, como frutas, verduras y pescado.¹



Debido a la variedad de tipos del virus, es posible enfermarse por norovirus en varias ocasiones durante toda la vida; el motivo es la inmunidad específica solo para el tipo de virus infectante y la inexactitud de la duración de la inmunidad.²

Bibliografía

1.- Capece G, Gignac E. Norovirus. [Internet]. StatPearls; 2023. [Consultado en marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513265/>

2.- Centers for Disease Control and Prevention. Norovirus. [Internet]. EUA: CDC; 2023. [Consultado en marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/norovirus/index-sp.html>